

# 予防接種のお知らせ


# 日本脳炎

★予診票を紛失した場合、糸満市ホームページからダウンロード可能。

<b>標準 接種期間</b>	<p>① 1期初回1回 3歳の間に</p> <p>② 1期初回2回 3歳の間に</p> <p>③ 1期追加 4歳～5歳の間に</p> <p>④ 2期 9歳の間に</p>
<b>【Ⅰ期】 接種年齢</b>	生後6ヶ月から7歳半の前日
	※3歳未満ではワクチン量が半分（0.25ml）
<b>回数</b>	3回（①1期初回1回目、②1期初回2回目、③1期追加）
<b>予診票 送付時期</b>	初回1・2回目…3歳の誕生日 追加（3回目）…4歳の誕生日
<b>【Ⅱ期】 対象年齢</b>	9歳から13歳の前日
<b>回数</b>	1回
<b>予診票 送付時期</b>	Ⅱ期（4回目）…9歳の誕生日

<b>接種 医療機関</b>	<p>別紙「個別予防接種医療機関（南部地区）」 または本島内の医師会加盟医療機関（直接、医療機関へお問合せ）</p> <p>※県外や県内離島での接種には糸満市からの依頼書が必要です。 詳細は糸満市ホームページをご覧ください。お電話にてお問い合わせ下さい。</p>
<b>料金</b>	<p>無料</p> <p>※公費対象期間を過ぎると全額自己負担（約8,500円×4回）。</p>
<b>持ち物</b>	<p>親子健康手帳、予診票</p> <p>住所が分かるもの（子ども医療費受給資格者証、マイカード等）</p>
<b>その他</b>	別紙「予防接種について」参照。

## ■ 他の予防接種との間隔（同時接種希望の場合は医師と相談。）



おしえて！ チックン！



日本脳炎は、蚊によって運ばれるウイルスが原因の病気です。多くの場合は症状は出ませんが、まれに脳炎になることがあります。脳炎になるとけいれんが出るなど重症になり、2～4割の人が亡くなってしまふといわれています。蚊が多くなる前に早めに接種をすませましよう。



### 日本脳炎について教えて

日本脳炎ウイルスの感染で起こります。ヒトから直接ではなくブタなどの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。7～10日の潜伏期間後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎になることがあります。ヒトからヒトへの感染はありません。

日本脳炎ウイルスに感染した人のうち100～1,000人に1人が脳炎等を発症します。脳炎のほか髄膜炎や夏かぜ様の症状で終わる人もいます。脳炎にかかった時の致死率は約20～40%ですが、治った後に神経の後遺症を残す人が多いです。

## ■ 副反応について

副反応とは、ワクチンを接種したあとに起こるかもしれないからだの反応のことです。日本脳炎のワクチンでは、熱が出たり、せきや鼻水が出ることがあります。接種部位が赤くなることもあります。きわめて稀に、アナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、血小板減少性紫斑病、脳炎などの重い病気にかかることがあるといわれています。

お問い合わせ先

糸満市役所 健康推進課 予防係 電話：098-840-8126