

予防接種のお知らせ


DT【2期】 (ジフテリア・破傷風混合)

★予診票を紛失した場合、糸満市ホームページからダウンロード可能。

DT予防接種は、乳幼児期の4種混合予防接種の2期にあたります。4種混合予防接種でつった基礎免疫をさらに保つため、2期の接種が必要です。接種もれのないようご注意ください。

標準接種期間	11歳	
公費対象期間	11歳から13歳の前日まで	
回数	1回	
接種場所	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「個別予防接種医療機関(南部地区)」 ・または本島内の医師会加盟医療機関(直接、医療機関へお問合せ) <p>※県外や県内離島での接種には糸満市からの依頼書が必要です。 詳細は糸満市ホームページをご覧くださいか、お電話にてお問い合わせ下さい。</p>	
料金	無料	※対象年齢を過ぎると全額自己負担【約7,000円】となります
持ち物	<ul style="list-style-type: none"> ・親子健康手帳 ・予診票 ・住所が分かるもの(子ども医療費受給資格者証、マイカード等) 	
その他	別紙「予防接種について」参照。	

■ 他の予防接種との間隔(同時接種希望の場合は医師と相談してください。)



おしえて！チクン！



DTワクチンってなに？

ジフテリア（D）と破傷風（T）の2種混合ワクチンです。



ジフテリアってどんな病気

ジフテリア菌によって発生する病気です。のどなどについてジフテリア菌が毒素を出し、それが神経や心臓の筋肉に作用することで、眼球や横隔膜（呼吸に必要な筋肉）などの麻痺、心不全をきたして重篤になる場合やなくなってしまう場合もあります。



破傷風ってどんな病気？

破傷風は破傷風菌により発生し、かかった場合に亡くなる割合が非常に高い病気です。以前は新生児の発生も見られましたが、近年は30歳以上の成人を中心に患者が発生しています。土の中にいる破傷風菌が傷口に入って感染を起こし、毒素を通して神経に作用し筋肉をけいれんさせます。口が開きにくい、顎が疲れるといった症状に始まり、歩行や排尿・排便の障害などを経て、最後には全身の筋肉が固くなって体を弓のようにそらせたり、息ができなくなって亡くなる場合もあります。

■ 4種混合予防接種の回数が不足している方へ

D Tの予防接種は乳幼児期の4種混合予防接種の2期接種にあたります。4種混合予防接種が完了していない場合、基礎免疫が十分にできていない可能性があります。このような場合、今回のD T定期接種の後、追加でD Tワクチンを接種する方法があります。ただし、追加の分は任意接種となるため全額自己負担です。接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談ください。

■ 副反応について

副反応とは、ワクチンを接種したあとに起こるかもしれない体の反応のことです。接種部位が赤くなったり、腫れたり、硬くなることがあります。また、熱が出ることもあります。きわめて稀に、アナフィラキシーなどの重い反応が見られることもあります。

お問い合わせ先

糸満市役所 健康推進課 予防係 電話：098-840-8126